

Acacia mearnsii De Wild.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Fabales
FAMILIA: Leguminosae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Acacia negra / Español
Black wattle / Inglés



SINÓNIMOS

Racosperma mearnsii (De Wild.) Pedley

DESCRIPCIÓN

Árbol de 6-20 m de altura, perenne, con pubescencia fina en las ramillas. Hojas bipinnadas, folíolos de 1,5-4 mm de largo, color verde oliva, con glándulas en el raquis entre pinnas. Flores amarillo-crema. Fruto vaina de color marrón oscuro, con pubescencia fina.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Acacia mearnsii

FORMA BIOLÓGICA

Arbórea

AMBIENTE NATURAL

Bosques riparios. Amplio rango desde clima tropical húmedo a templado seco, entre 600-1700 m de altitud.

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Sin información

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS,
DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO,
BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)