


Acipenser naccarii Bonaparte, 1836.

REINO: Animalia
 PHYLUM: Chordata
 CLASE: Actinopterygios
 ORDEN: Acipenseriformes
 FAMILIA: Acipenseridae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Esturión / Español
 Adriatic sturgeon / Inglés


SINÓNIMOS

Acipenser heckelii Fitzinger, 1836
Acipenser nardoi Heckel, 1851
Acipenser platycephalus Bonaparte, 1846

DESCRIPCIÓN

Hocico moderado, muy amplio y redondeado en la punta. Labio más bajo continuo, interrumpido en el centro. Barbillas más cerca a la punta del hocico que a la boca. Cinco filas de escamas, dorsales 10-14, laterales 32-42, sin pequeñas placas entre filas dorsales y laterales. La parte trasera es marrón olivácea, blanco ventralmente.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Acipenser naccarii

FORMA BIOLÓGICA

Pez

AMBIENTE NATURAL

Demersal; anádromo; de agua dulce, salobre o marino; rango de profundidad 10 – 40 m

DIETA / ALIMENTACIÓN

Carnívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Acuicultura

Vector: Agua

INTRODUCCIÓN

Causa: Para acuicultura

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: 1995

USO ECONÓMICO

Acuicultura

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)