

Aira caryophyllea L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Liliopsida
ORDEN: Cyperales
FAMILIA: Poaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA



SINÓNIMOS

Agrostis caryophyllea (L.) Salisb.
Airella caryophyllea (L.) Dumort.
Airopsis caryophyllea (L.) Fr.

DESCRIPCIÓN

Pasto anual, erecto de 10-30 cm de altura. Hojas de vaina algo escabrosa, lámina glabra, áspera de 1 hasta 9 cm de largo, lígula aguda de 1-5 mm de largo. Inflorescencia en panoja laxa, grácil, abierta de 4-12 cm de largo. Espiguillas 2 floras, ovoides de 2-4 cm de largo, pediceladas. Fruto cariopse elíptico, de 1 mm de largo. Florece en primavera.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Agrostis palustris

FORMA BIOLÓGICA

Gramínea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autoprogación

Vector: Viento • Suelo

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Accidental

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Habita campos y arenas del sur de Uruguay

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

<http://inbuy.fcien.edu.uy>



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)