

Avena sterilis L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Liliopsida
ORDEN: Cyperales
FAMILIA: Poaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Avena mora / Español



SINÓNIMOS

Avena sativa subsp. *sterilis* (L.) de Wet
Avena sativa var. *sterilis* (L.) Fiori

DESCRIPCIÓN

Pasto anual, de 0,5-1,8 m de altura. Hojas de vaina cerrada en hojas basales, a veces con pelos, lámina plana de 10-55 cm de largo, lígula obtusa o aguda de 3-7 mm de largo. Inflorescencia en panoja laxa, de 20-55 cm de largo, con espiguillas colgantes. Espiguilla de 2-4 cm de largo. Fruto cariopse de 7-8 mm de largo y algo menos ancho que el antecio. Florece en primavera.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Avena sterilis

FORMA BIOLÓGICA

Gramínea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Viento • Suelo

INTRODUCCIÓN

Causa: Para forraje

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Forraje

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Agricultura. Especie común, habita lugares muy variados

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

<http://inbuy.fcien.edu.uy>



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)