

Boccardiella ligerica [Ferronière, 1898]

REINO: Animalia
 PHYLUM: Arthropoda
 CLASE: Maxillopoda
 ORDEN: Thoracica
 FAMILIA: Balanidae

NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Spionid worm / Inglés

SINÓNIMOS


DESCRIPCIÓN

Posee líneas rojas verticales en el caparazón y 12-13 dientes en el labro. El adulto no sobrepasa los 19 mm. Hermafroditas con fecundación cruzada. Fase larval planctónica que pasa por 6 estadíos larvales antes de fijarse como adulto.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



0 100 200 km



ORIGEN GEOGRÁFICO

Boccardiella ligerica

FORMA BIOLÓGICA

Poliqueto

AMBIENTE NATURAL

Estuarino, marino, bentónico,
submareal hasta 10 m de profundidad

DIETA / ALIMENTACIÓN

Detritívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Transporte de material
ambiental • Traslado de
embarcaciones

Vector: Agua

INTRODUCCIÓN

Por transporte de materiales naturales

Forma: Accidental

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE
SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)