


# *Bromus racemosus* L.

REINO: ..... Plantae  
PHYLUM: ..... Magnoliophyta  
CLASE: ..... Liliopsida  
ORDEN: ..... Cyperales  
FAMILIA: ..... Poaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA



SINÓNIMOS

*Bromus mollis* var. *racemosus* (L.) Fiori  
*Bromus arvensis* var. *racemosus* (L.) Neilr.

DESCRIPCIÓN

Pasto anual, de 20-60 (80) cm de altura al florecer. Hojas vellosas de lámina plana de 5-15 cm (22) de largo, y lígula de 1-1,5 mm. Inflorescencia en panoja laxa o racimo de 8-12 (4-22) cm de largo. Espiguilla lanceolada, comprimida lateralmente, glabra, conteniendo 4-8 flores. Fruto cariopse, de 7-8 mm de largo, muy comprimido dorsi-ventralmente y acanalado en U, de color castaño-violáceo. Florece en verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

# *Bromus racemosus*

## FORMA BIOLÓGICA

Gramínea

## AMBIENTE NATURAL

Herbazales húmedos y praderas.

## REPRODUCCIÓN

Semillas

## DISPERSIÓN

**Ruta:** Sin información

**Vector:** Viento

## INTRODUCCIÓN

**Causa:** Sin información

**Forma:** Sin información

**Sitio:** Sin información

**Fecha:** Sin información

## USO ECONÓMICO

Sin información

## AMBIENTES PREFERENCIALES

### DE INVASIÓN

Habita lugares variados, dispersada al Sur de Uruguay

## IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

## CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

## PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

**InBUy**

Base de datos de Invasiones  
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República  
Facultad de Ciencias



**iabin**

Red Interamericana de  
Información sobre Biodiversidad  
Red de Información sobre Especies  
Invasoras (I3N)