


Bromus racemosus L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Liliopsida
ORDEN: Cyperales
FAMILIA: Poaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA



SINÓNIMOS

Bromus mollis var. *racemosus* (L.) Fiori
Bromus arvensis var. *racemosus* (L.) Neilr.

DESCRIPCIÓN

Pasto anual, de 20-60 (80) cm de altura al florecer. Hojas vellosas de lámina plana de 5-15 cm (22) de largo, y lígula de 1-1,5 mm. Inflorescencia en panoja laxa o racimo de 8-12 (4-22) cm de largo. Espiguilla lanceolada, comprimida lateralmente, glabra, conteniendo 4-8 flores. Fruto cariopse, de 7-8 mm de largo, muy comprimido dorsi-ventralmente y acanalado en U, de color castaño-violáceo. Florece en verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Bromus racemosus

FORMA BIOLÓGICA

Gramínea

AMBIENTE NATURAL

Herbazales húmedos y praderas.

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Sin información

Forma: Sin información

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Habita lugares variados, dispersada al Sur de Uruguay

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)