

# *Cakile maritima* Scop.

REINO: ..... Plantae  
PHYLUM: ..... Magnoliophyta  
CLASE: ..... Magnoliopsida  
ORDEN: ..... Capparidales  
FAMILIA: ..... Cruciferae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA  
Rábano marino / Español

SINÓNIMOS  
*Rapistrum maritimum* (Scop.) Bergeret ex DC.

## DESCRIPCIÓN

Hierba anual de tallos erectos o suberectos, de 10-50 cm de altura, glabra. Hojas carnosas o semicarnosas, glaucas, largas de 3-8 cm de segmentos obtusos. Flores blancas o liláceas de 2 cm de diámetro. Fruto silícuca de 1-2 cm de largo, formada por dos artejos (segmentos), el inferior con dos salientes laterales, el superior de ápice alargado. Florece en el verano.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

# *Cakile maritima*

## FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

## AMBIENTE NATURAL

Costa arenosa, en la línea de costa

## REPRODUCCIÓN

Semillas

## DISPERSIÓN

**Ruta:** Vegetación flotante • restos o desechos

**Vector:** Agua • Viento

## INTRODUCCIÓN

**Causa:** Por transporte de materiales naturales

**Forma:** Accidental

**Sitio:** Sin información

**Fecha:** Sin información

## USO ECONÓMICO

Sin información

## AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Cordón dunar, vegetación costera reas disturbadas, áreas urbanas, terrenos removidos, baldíos.

## IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

## CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

## PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

**InBUy**

Base de datos de Invasiones  
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República  
Facultad de Ciencias



**iabin**

Red Interamericana de  
Información sobre Biodiversidad  
Red de Información sobre Especies  
Invasoras (I3N)