

Cakile maritima Scop.

REINO:..... Plantae
PHYLUM:..... Magnoliophyta
CLASE:..... Magnoliopsida
ORDEN: Capparidales
FAMILIA: Cruciferae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA
Rábano marino / Español

SINÓNIMOS
Rapistrum maritimum (Scop.) Bergeret ex DC.

DESCRIPCIÓN

Hierba anual de tallos erectos o suberectos, de 10-50 cm de altura, glabra. Hojas carnosas o semicarnosas, glaucas, largas de 3-8 cm de segmentos obtusos. Flores blancas o liláceas de 2 cm de diámetro. Fruto silícuca de 1-2 cm de largo, formada por dos artejos (segmentos), el inferior con dos salientes laterales, el superior de ápice alargado. Florece en el verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Cakile maritima

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Costa arenosa, en la línea de costa

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Vegetación flotante • restos o desechos

Vector: Agua • Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Accidental

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Cordón dunar, vegetación costera reas disturbadas, áreas urbanas, terrenos removidos, baldíos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)