

Carduelis chloris Linnaeus, 1758

REINO: Animalia
 PHYLUM: Chordata
 CLASE: Aves
 ORDEN: Passeriformes
 FAMILIA: Fringillidae



Foto Luciano Liguori

NOMBRE COMÚN / IDIOMA


Verderón / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Ave de 14 cm de largo. Machos de color verde amarillento, con manchas amarillas en las alas y cola. Hembra de color más apagado con tonos de marrón claro, con manchas amarillo claro en alas y cola. Habita zonas antrópicas y pastizales con árboles..

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Carduelis chloris

FORMA BIOLÓGICA

Ave

AMBIENTE NATURAL

Sin información

DIETA / ALIMENTACIÓN

Granívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: Sin información

Forma: Sin información

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS,
DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO,
BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)