

Carthamus lanatus L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Asterales
FAMILIA: Asteraceae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA
Cardo cruz / Español

SINÓNIMOS
Kentrophyllum lanatum (L.) DC.

DESCRIPCIÓN

Planta anual, espinosa, pubescente, de 40-80 cm de altura, con ramas dispuestas en cruz. Hojas sésiles, de base semiabrazadora, de 3-5 cm de largo, dentadas, lobadas a pinatisectas, y ápice terminado en espina aguda. Capítulos obovoides, de 4 cm. Brácteas del involucre coriáceas, lanceoladas con dientes y ápice espinoso. Flores amarillas. Fruto aquenio, anguloso, de 5 mm. Papus formado por escamas paleáceas ciliadas. Florece en el verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Carthamus lanatus

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Campos de cultivo y cunetas

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Agricultura • Autopropagación

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Accidental

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Agricultura, áreas disturbadas, ambientes secos y soleados.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)