

Centaurea solstitialis L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Asterales
FAMILIA: Asteraceae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Planta bianual, lanosa, grisácea, erecta o suberecta, con tallos alados de hasta 150 cm de altura. Hojas lineales, las basales de 20 cm de long., pinnatífidas; las caulinares menores mucronuladas. Capítulos solitarios, globosos. Brácteas involucrales terminadas en fuerte espina, con espinitas en su base. Flores amarillas. Fruto aquenio de 2,5-3 mm de long. Pappus de pelos numerosos, poco más largos que el aquenio. Florece en verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Centaurea solstitialis

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Accidental

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS,
DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO,
BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)