


Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Chordata
 CLASE:..... Teleostomi
 ORDEN: Cypriniformes
 FAMILIA: Cyprinidae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Carpa herbívora / Español
 Grass carp / Inglés


SINÓNIMOS

Leuciscus idella Valenciennes, 1844

DESCRIPCIÓN

Espinas dorsales: 3 - 3; Radios dorsales: 7 - 8; Espinas anales: 3; Radios anales: 7 – 11. No tiene barbillones mentonianos. Hocico muy corto, su largo es menor o igual que el diámetro del ojo. Largo pos-orbital más que la mitad del largo de la cabeza. Presenta 18 radios en la aleta caudal. Tolerante en un amplio rango de temperatura de 0-38°C, y salinidades de hasta 10 ppm y niveles de oxígeno menores a 0,5 ppm.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Ctenopharyngodon idella

FORMA BIOLÓGICA

Pez

AMBIENTE NATURAL

Demersal potamodromo de agua dulce y rango de profundidad de 0-30 m. Habita lagos, estanques y embalses de grandes ríos, prefiriendo cuerpos de agua de poca corriente con vegetación.

DIETA / ALIMENTACIÓN

Herbívoro • Detritívoro • Insectívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Acuicultura

Vector: Agua

INTRODUCCIÓN

Introducida desde Brasil

Causa: En asociación con acuicultura

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: 1994

USO ECONÓMICO

Acuicultura

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Aguas continentales, Lagos, Ríos.

Evaluada en Fishbase como potencial plaga

IMPACTOS ECOLÓGICOS

Constatada como especie plaga

IMPACTOS (ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

<http://inbuy.fcien.edu.uy>



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)