

# *Dama dama* Linneaus, 1758

REINO: ..... Animalia  
 PHYLUM: ..... Chordata  
 CLASE: ..... Mammalia  
 ORDEN: ..... Artiodactyla  
 FAMILIA: ..... Cervidae



Foto Enrique M. González

## NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Ciervo dama / Español  
 Fallow deer / Español

## SINÓNIMOS

## DESCRIPCIÓN

Coloración dorsal castaño claro, con ocelos de color crema en el lomo y en los flancos; ventralmente más claro. Astas planas, en forma de paleta, los bordes posteriores irregularmente lobados, con 1 a 3 pares de candiles anteriores en cada asta. Borde anterior de las astas liso, sin irregularidades. Cola de 16 a 20 cm de largo, dorsalmente negra, espejo blanco con borde negro. Sin glándulas nasales. Hábito diurno, gregario sobre todo las hembras con crías y juveniles. Machos solitarios salvo en época de apareamiento. Hembras paren una a dos crías. Gestación de 8 meses de duración.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



0 100 200 km



## ORIGEN GEOGRÁFICO

# Dama dama

## FORMA BIOLÓGICA

Mamífero

## AMBIENTE NATURAL

Bosques húmedos de hoja caduca

## DIETA / ALIMENTACIÓN

Herbívoro

## REPRODUCCIÓN

Sexual

## DISPERSIÓN

**Ruta:** Sin información

**Vector:** Sin información

## INTRODUCCIÓN

En asociación con comercio de animales

**Causa:** Para caza

**Forma:** Voluntaria

**Sitio:** Sin información

**Fecha:** Sin información

## USO ECONÓMICO

Cotos de caza

## AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Sin información

## IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

## CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

## PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

**InBUy**

Base de datos de Invasiones  
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República  
Facultad de Ciencias



**iabin**

Red Interamericana de  
Información sobre Biodiversidad  
Red de Información sobre Especies  
Invasoras (I3N)