


Echium plantagineum L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Lamiales
FAMILIA: Boraginaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Borraja cimarrona / Español
Flor morada / Español



SINÓNIMOS

Echium violaceum L.

DESCRIPCIÓN

Hierba anual o bienal, que alcanza florecida 50-100cm. Hojas basales en rosetón aplanado, oblongo-elípticas hasta espatuladas, angostadas en el pecíolo, vellosas hasta híspidas, de 15 a 25 cm; las caulinares alargadas, de base semi-amplexicaule, íntegras, largas de 5-10 cm. Flores azul-violáceo hasta róseo y raramente blanco, dispuestas en cincinos sobre ramificaciones laterales del tallo. Cáliz 5 partido, de 8 mm de largo de sépalos híspidos. Fruto incluido en el cáliz, éste algo acrecido.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Echium plantagineum

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Campos y terrenos arenosos

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Viento • Suelo

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Accidental

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Agricultura, áreas disturbadas, terrenos baldíos, bordes de caminos, maleza de cultivos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL QUÍMICO

Todo proceso de control se debe realizar con equipamiento de seguridad y en el caso de uso de productos químicos, siguiendo la orientación del fabricante y observando los cuidados para evitar impactos ambientales paralelos.

Uso de herbicidas

CONTROL (FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)