

Eucalyptus viminalis Labill.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Myrtales
FAMILIA: Myrtaceae



Foto Silvana Masciadri

NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Eucalipto / Español

Eucalipto blanco/ Español

SINÓNIMOS


Eucalyptus paniculata Sm.

Eucalyptus resinifera Smith in J. White

DESCRIPCIÓN

Árbol grande, corteza caduca en fajas largas. Primeras hojas opuestas, sésiles; las adultas de 9-22 cm de largo x 0,8-2 cm de ancho, alternas, falcadas. Flores 3 ó 5-7 dispuestas en inflorescencias simples, axilares. Pedúnculos de 0,5-1 cm de largo, cilíndricos hasta achatados. Opérculo cónico-rostrado hasta hemisférico-rostrado, igual que el hipanto. Frutos de 0,5-0,9 cm de diámetro, globosos. Valvas 3-4 exsertas.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Eucalyptus viminalis

FORMA BIOLÓGICA

Arbórea

AMBIENTE NATURAL

Zonas costeras y continentales, clima templado-templado frío, húmedo-subhúmedo. Suelos fértiles bien drenados.

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: Por interés forestal

Forma: Voluntaria

Sitio: Montevideo

Fecha: 1853

USO ECONÓMICO

Cultivado en cortavientos, montes de abrigo, forestaciones comerciales, ornamental.

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)