

Foeniculum vulgare Mill.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Apiales
FAMILIA: Apiaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Hinojo / Español


SINÓNIMOS

Anethum foeniculum L.
Foeniculum officinale All.


DESCRIPCIÓN

Herbácea perenne, glabra y erecta, muy aromática, de hasta 2 m de altura. Hojas basales grandes, de 20-40 cm de largo, alternas, 3-4 pinnatisectas de segmentos filiformes. Pecíolo de base envainadora. Hojas superiores menores y con pecíolo corto o reducido a la vaina. Flores amarillas, dispuestas en umbelas compuestas, con pedúnculos cortos y largos y radios de 7 a 30. Brácteas ausentes. Fruto oblongo u ovoide, de 4-6 mm de largo, raramente 8-10. Florece en el verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



0 100 200 km



ORIGEN GEOGRÁFICO

Foeniculum vulgare

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Herbazales y praderas húmedas

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Es utilizada suplantando el anís, dado la similitud de su fuerte aroma

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Áreas disturbadas, orillas de caminos, carreteras, vías férreas y terrenos baldíos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)