

Fraxinus lanceolata Borkh. *

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Lamiales
FAMILIA: Oleaceae



Foto Silvana Masciadri

NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Fresno / Español

Ash / Inglés

SINÓNIMOS



Calycomelia lanceolata (Borkh.) Lunell

Fraxinus pennsylvanica var. *lanceolata* (Borkh.) Sarg.

DESCRIPCIÓN

Arbol dioico, glabro, caduco, de rápido crecimiento, pudiendo alcanzar 15-18 m de altura. Corteza persistente y asurcada. Hojas con 5-9 folíolos aovados, lanceolados u oblongo-lanceolados, dentados, verdes en ambas caras, pero más pálido en la inferior. Flores sin corola, dispuestas en panojas. Sámara derechas, con el ala ligeramente decurrente en la semilla, persistentes en la planta después de caer las hojas. Florece en Setiembre.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Fraxinus lanceolata *

FORMA BIOLÓGICA

Arbórea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Mejoramiento de paisaje •

Autopropagación

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Bosques

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

* *registradas como invasoras en al menos una localidad*

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)