

Fumaria capreolata L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Ranunculales
FAMILIA: Papaveraceae



Foto Liliana Delfino

NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Fumaria / Español



SINÓNIMOS

Fumaria capreolata fo. *sciophila* Ruiz Leal

DESCRIPCIÓN

Hierba anual, glabra, con tallos de sección cuadrangular de 25-50 cm, y hasta 100 cm cuando apoyantes. Hojas alternas, 2-3 pinnatisectas, de 8-15 cm de largo. Segmentos elípticos hasta ovals, íntegros, lobados. Flores blancas a róseas, oscuras en el ápice, de 8-15 mm, dispuestas en racimos. Fruto aquenio, globoso, liso de 2 mm. Florece en primavera y verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Fumaria capreolata

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Herbazales nitrófilos, terrenos removidos

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Accidental

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Agricultura, áreas disturbadas, áreas urbanas. Habita terrenos removidos como orillas de caminos, jardines, terrenos abandonados y tierras cultivadas.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)