

Gaudinia fragilis (L.) Beauv.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Liliopsida
ORDEN: Cyperales
FAMILIA: Poaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA



SINÓNIMOS

Avena fragilis L.

DESCRIPCIÓN

Pasto anual, erecto, de 20-70 cm de altura. Hojas vellosas, vaina entera en hojas inferiores, lámina plana de 5-11 cm de largo. Inflorescencia en espiga de 5-26 cm de largo, dística, desarticulada en la madurez. Espiguilla sécil comprimida lateralmente de 3-6 flores. Fruto cariopse de 3-4 mm, glabro en la región seminal y vellosa en la región apical. Florece en invierno.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Gaudinia fragilis

FORMA BIOLÓGICA

Gramínea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Forraje

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Forrajera. Hierba apetecida por el ganado pero poco productiva.

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Pastizales. Común en los departamentos de Lavalleja y Maldonado.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)