

Nandayus nenday (Vieillot, 1823)

REINO: Animalia
 PHYLUM: Chordata
 CLASE: Aves
 ORDEN: Psittaciformes
 FAMILIA: Psittacidae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA


Loro cabeza negra / Español
 Black-hooded parakeet / Inglés

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Cotorra de 30-34 cm de largo y hasta 140 gr. de peso. Plumaje color verde, con una mancha azul-negra rodeando la parte superior de la cabeza, que llega a la base del pico y borde de los ojos. Por debajo de éstos presenta un verde más pálido cruzada por una franja negra. En la zona de garganta presenta un collar de color azulado. Las alas son de color negro-azulado. La parte inferior de la cola es verde oscuro y el pico negruzco. Los juveniles presentan una cola más corta que los adultos. No presentan dimorfismo sexual.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Nandayus nenday

FORMA BIOLÓGICA

Ave

AMBIENTE NATURAL

Habitan sabanas, zonas boscosas y palmerales, siendo el típico ave del Pantanal. Generalmente se encuentran en las proximidades de cursos de agua.

DIETA / ALIMENTACIÓN

Granívoro • Frugívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: En asociación con comercio de mascotas

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Bosques. Registrado al Suroeste de Uruguay. Poco común.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

<http://inbuy.fcien.edu.uy>



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)