

Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758

REINO: Animalia
 PHYLUM: Chordata
 CLASE: Mammalia
 ORDEN: Lagomorpha
 FAMILIA: Leporidae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Conejo / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Coloración dorsal gris amarillento, ventral blanco. Cola con dorso negro y ventralmente blanca de 6 cm de largo. La nuca es rojiza. Presentan un círculo claro alrededor de los ojos. Orejas de menos de 9 cm de largo. Miembros anteriores y posteriores cortos. Hábito gregario, crepuscular y nocturno. Hervíboros, hasta granívoros y frugívoros. Pueden tener camadas cada 40 días, con 2 a 12 crías por cada una. Alcanzan la madurez sexual entre los 5 y 8 meses de edad.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



0 100 200 km



ORIGEN GEOGRÁFICO

Oryctolagus cuniculus

FORMA BIOLÓGICA

Mamífero

AMBIENTE NATURAL

Áreas modificadas por el hombre, granjas y ciudades.

DIETA / ALIMENTACIÓN

Herbívoro • Granívoro • Frugívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Humano

INTRODUCCIÓN

Fue introducida en las Islas costeras del Río de la Plata y Océano Atlántico para alimentación de marineros.

Causa: Para fines alimenticios

Forma: Voluntaria

Sitio: Islas del Océano Atlántico y Río de la Plata

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Cría para alimentación

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

<http://inbuy.fcien.edu.uy>



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)