


# *Paralaoma servilis* [Shuttleworth, 1852]

REINO:..... Animalia  
 PHYLUM:..... Mollusca  
 CLASE:..... Gastropoda  
 ORDEN: ..... Stylommatophora  
 FAMILIA: ..... Punctidae



## NOMBRE COMÚN / IDIOMA


## SINÓNIMOS

*Punctum conspectum* (Bland, 1865).  
*Paralaoma caputspinulae* (Reeve, 1852)


## DESCRIPCIÓN

Caracol de entre 1 y 2 mm de largo total, el ombligo es un tercio de diámetro de la concha.  
 Pie blancuzco. Cabeza y tentáculos oscuros hasta negros.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



0 100 200 km



## ORIGEN GEOGRÁFICO

# Paralaoma servilis

## FORMA BIOLÓGICA

Molusco

## AMBIENTE NATURAL

Hojarasca en descomposición, bajo árboles caducos

## DIETA / ALIMENTACIÓN

Sin información

## REPRODUCCIÓN

Sexual

## DISPERSIÓN

**Ruta:** Sin información

**Vector:** Sin información

## INTRODUCCIÓN

**Causa:** Sin información

**Forma:** Accidental

**Sitio:** Sin información

**Fecha:** Sin información

## USO ECONÓMICO

Sin información

## AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

**InBUy**

Base de datos de Invasiones  
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República  
Facultad de Ciencias



**iabin**

Red Interamericana de  
Información sobre Biodiversidad  
Red de Información sobre Especies  
Invasoras (I3N)