


Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Liliopsida
ORDEN: Cyperales
FAMILIA: Poaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Kikuyo / Español



SINÓNIMOS

Cenchrus villosus (R. Br. ex Fresen.) Kuntze

DESCRIPCIÓN

Pasto perenne, rizomatoso, de 30-70 cm de altura. Hojas de vaina estriada, pubescente en el margen, de hasta 20 cm de largo; lámina plana de 10-40 cm de largo, con asperezas en la cara superior; lígula en forma de pelos. Inflorescencia en panoja espiciforme, ovoide hasta oblonga de 4-10 cm de largo. Espiguillas con 2 flores, lanceoladas. Cariopse de 2-3mm de largo. Florece a finales del verano y principios de otoño.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Pennisetum villosum

FORMA BIOLÓGICA

Gramínea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas • Rizomas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Sin información

Forma: Sin información

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Áreas urbanas. Habita en la costa del Río de la Plata y en parques y jardines urbanos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

<http://inbuy.fcien.edu.uy>



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)