

Phoneutria nigriventer (Keyserling, 1891)

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Arthropoda
 CLASE:..... Arachnida
 ORDEN: Araneae
 FAMILIA: Ctenidae



Foto Miguel Simó

NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Araña del banano / Español

SINÓNIMOS
Phoneutria keyserlingi (Pickard-Cambridge, 1897)


DESCRIPCIÓN

Árácido bastante grande, las hembras de 3-5 cm de largo corporal con un legspan de 13-15 cm. Los machos son más pequeños, de 3-4 cm de largo corporal y un legspan de 15 cm. El color varía dependiendo de la localidad, pero comunmente es de color marrón con pequeños puntos más claros, con una línea más oscura localizada en pares en el abdomen. El lado ventral es usualmente más oscuro con una mancha marrón oscuro o negra en el abdomen (de ahí su nombre nigriventer).

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



0 100 200 km



ORIGEN GEOGRÁFICO

Phoneutria nigriventer

FORMA BIOLÓGICA

Arácnido

AMBIENTE NATURAL

Bosques tropicales y subtropicales

DIETA / ALIMENTACIÓN

Carnívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Contenedores (containers)

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Ingresada en cargamentos de banana desde Brasil.

Causa: En asociación con comercio de comida viva

Forma: Accidental

Sitio: Montevideo

Fecha: 1971

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS)

Sin información

IMPACTOS DE SALUD

Han sucedido picaduras en las personas que trabajan manejando este recurso en el Mercado Modelo

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)