


Rumex obtusifolius L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Polygonales
FAMILIA: Polygonaceae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA
Lengua de vaca / Español

SINÓNIMOS
Lapathum obtusifolium (L.) Moench
Lapathum sylvestre Lam.

DESCRIPCIÓN

Hierba robusta, erecta, de 60-100 cm de altura. Hojas basales grandes, anchas, obtusas o subagudas, de base irregularmente cordada márgenes algo crespos, pecíolo tan largo como la lámina o mayor; las superiores menores de pecíolo corto. Panoja grande, periantos con segmentos obtusos, que encierran el fruto. Valvas íntegras o con algunos dientes en sus bases. Florece en noviembre y diciembre.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Rumex obtusifolius

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Terrenos perturbados, bordes de caminos, pastizales y arbustales con humedad.

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Agua • Suelo

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Accidental

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Áreas disturbadas, humedales, cursos de agua, terrenos húmedos hasta anegados, orillas de cursos de agua, zanjas.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

En *Rumex* spp. se puede aprovechar en el momento de la floración cortar el tallo floral, evitando la producción de frutos, ya que tienen una gran producción de semillas.

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)