

Tragopogon porrifolius L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Asterales
FAMILIA: Asteraceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA



Salsifí / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Hierba bienal, erecta, glabra, de 20-80 cm al florecer, con raíz gruesa. Hojas lineales a lineal-lanceoladas, íntegras, de 10-40 cm de largo de base algo abrazadora. Capítulos terminales, mediano-grandes, sobre un pedúnculo engrosado en la parte superior, hueco. Involucro de 2,5-4 cm de altura. Brácteas lanceoladas, largamente atenuadas en el ápice. Flores lilas, violáceas o rojo-purpúreas. Fruto aquenio de 10-14 mm, con 10 costillas y espínulas cortas, con rostro más largo que el aquenio. Papus plumoso de 10-15 mm de largo. Florece en primavera.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Tragopogon porrifolius

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Cunetas, orillas de campos, pasturas secas y subnitrófilos

REPRODUCCIÓN

Semillas • Rizomas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación • Agricultura

Vector: Viento • Suelo

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Sin información

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Agricultura. Cultivada por su raíz comestible

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Áreas disturbadas, áreas urbanas.

Habita en orillas de caminos, terrenos removidos, parque y jardines.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)