

Acipenser baerii baerii Brandt, 1869.

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Chordata
 CLASE:..... Actinopterygios
 ORDEN: Acipenseriformes
 FAMILIA: Acipenseridae



Foto Alicia Acuña

NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Esturión siberiano / Español
 Siberian sturgeon / Inglés

SINÓNIMOS
Acipenser baeri stenorrhynchus Nikolskii, 1896
Acipenser stenorrhynchus Nikolskii, 1896
Acipenser baerii Brandt, 1869

DESCRIPCIÓN
 Hocico extendido, 4 barbelos en el frente de la boca. La parte posterior es gris claro a marrón oscuro. El cinturón varía de blanco a amarillo claro. Cinco filas de escamas. 10-19D, 32-59L, 7-16V. Pequeñas escamas en forma de estrella entre las principales.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Pez

AMBIENTE NATURAL
 Demersal, anádromo, de agua dulce, rango de temperatura de 10 – 20° C

DIETA / ALIMENTACIÓN
 Carnívoro

REPRODUCCIÓN
 Sexual

DISPERSIÓN
Ruta: Acuicultura
Vector: Agua

INTRODUCCIÓN
 Introducidos como ovas fertilizadas
Causa: Para acuicultura
Forma: Voluntaria
Sitio: Sin información
Fecha: 1995

USO ECONÓMICO
 Acuicultura

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
 Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información