

Acipenser gueldenstaedtii [Brandt & Ratzeburg, 1833]

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Chordata
 CLASE:..... Actinopterygios
 ORDEN: Acipenseriformes
 FAMILIA: Acipenseridae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Esturión ruso / Español
 Russian sturgeon / Inglés

SINÓNIMOS
Acipenser aculeatus Lovetsky, 1834

DESCRIPCIÓN
 Pez de hasta 235 cm de largo. Coloración posterior gris-olivácea, flancos más claros y vientre blanco. Radios blandos dorsales 27-48. Radios blandos anales 16-35. Labio inferior discontinuo, interrumpido en el centro. Cinco filas de escudos, 7-19 dorsales, 24-44 laterales a cada lado, 6-13 ventrales a cada lado, con líneas de pequeñas placas óseas, estrelladas entre las filas dorsales y ventrales.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Pez

AMBIENTE NATURAL
 Templado. Agua dulce y salobre

DIETA / ALIMENTACIÓN
 Carnívoro • Detritívoro

REPRODUCCIÓN
 Sexual

DISPERSIÓN
Ruta: Acuicultura
Vector: Agua

INTRODUCCIÓN
 Introducidos como ovas fertilizadas
Causa: Para acuicultura
Forma: Voluntaria
Sitio: Río Negro
Fecha: 2005

USO ECONÓMICO
 Acuicultura

Acipenser gueldenstaedtii

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
 Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información