

# *Acipenser naccarii* Bonaparte, 1836.

REINO:..... Animalia  
 PHYLUM:..... Chordata  
 CLASE:..... Actinopterygios  
 ORDEN: ..... Acipenseriformes  
 FAMILIA: ..... Acipenseridae



## NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Esturión / Español  
 Adriatic sturgeon / Inglés


## SINÓNIMOS

*Acipenser heckelii* Fitzinger, 1836  
*Acipenser nardoi* Heckel, 1851  
*Acipenser platycephalus* Bonaparte, 1846

## DESCRIPCIÓN

Hocico moderado, muy amplio y redondeado en la punta. Labio más bajo continuo, interrumpido en el centro. Barbillas más cerca a la punta del hocico que a la boca. Cinco filas de escamas, dorsales 10-14, laterales 32-42, sin pequeñas placas entre filas dorsales y laterales. La parte trasera es marrón olivácea, blanco ventralmente.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

## FORMA BIOLÓGICA

Pez

## AMBIENTE NATURAL

Demersal; anádromo; de agua dulce, salobre o marino; rango de profundidad 10 – 40 m

## DIETA / ALIMENTACIÓN

Carnívoro

## REPRODUCCIÓN

Sexual

## DISPERSIÓN

**Ruta:** Acuicultura

**Vector:** Agua

## INTRODUCCIÓN

**Causa:** Para acuicultura

**Forma:** Voluntaria

**Sitio:** Sin información

**Fecha:** 1995

## USO ECONÓMICO

Acuicultura

# *Acipenser naccarii*

## AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información