


# Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758.

REINO:..... Animalia  
 PHYLUM:..... Chordata  
 CLASE:..... Actinopterygios  
 ORDEN: ..... Acipenseriformes  
 FAMILIA: ..... Acipenseridae



## NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Esturión / Español  
 Sterlet / Inglés

## SINÓNIMOS

*Acipenser dubius* Brusina, 1902  
*Acipenser gmelini* Fitzinger, 1836  
*Acipenser kamensis* Lovetsky, 1834

## DESCRIPCIÓN

Hocico angosto y en punta con 4 barbillones largos y en forma de flecos. Espinas dorsales: 13 - 13; Radios dorsales: 28 - 28; Espinas anales: 9; Radios anales suaves: 14 – 18. Flancos y parte posterior beige. Cinco filas de placas: 12-17D, 57-71L, 10-19V. Las ventrales y laterales son suavemente coloreadas, casi blancas.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

## FORMA BIOLÓGICA

Pez

## AMBIENTE NATURAL

Demersal, Protádromo, de agua dulce a salobre.

## DIETA / ALIMENTACIÓN

Carnívoro

## REPRODUCCIÓN

Sexual

## DISPERSIÓN

**Ruta:** Acuicultura

**Vector:** Agua

## INTRODUCCIÓN

**Causa:** Para acuicultura

**Forma:** Voluntaria

**Sitio:** Sin información

**Fecha:** 1995

## USO ECONÓMICO

Acuicultura

# Acipenser ruthenus

## AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información