

Boccardiella ligerica (Ferronière, 1898)

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Arthropoda
 CLASE:..... Maxillopoda
 ORDEN: Thoracica
 FAMILIA: Balanidae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Spionid worm / Inglés

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Posee líneas rojas verticales en el caparazón y 12-13 dientes en el labro. El adulto no sobrepasa los 19 mm. Hermafroditas con fecundación cruzada. Fase larval planctónica que pasa por 6 estadios larvales antes de fijarse como adulto.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Poliqueto

AMBIENTE NATURAL
 Estuarino, marino, bentónico,
 submareal hasta 10 m de profundidad

DIETA / ALIMENTACIÓN
 Detritívoro

REPRODUCCIÓN
 Sexual

DISPERSIÓN
Ruta: Transporte de material ambiental • Traslado de embarcaciones
Vector: Agua

INTRODUCCIÓN
 Por transporte de materiales naturales
Forma: Accidental
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Sin información

Boccardiella ligerica

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información