

Bromus racemosus L.

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Liliopsida
 ORDEN: Cyperales
 FAMILIA: Poaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA


SINÓNIMOS

Bromus mollis var. *racemosus* (L.) Fiori
Bromus arvensis var. *racemosus* (L.) Neill.

DESCRIPCIÓN

Pasto anual, de 20-60 (80) cm de altura al florecer. Hojas vellosas de lámina plana de 5-15 cm (22) de largo, y lígula de 1-1,5 mm. Inflorescencia en panoja laxa o racimo de 8-12 (4-22) cm de largo. Espiguilla lanceolada, comprimida lateralmente, glabra, conteniendo 4-8 flores. Fruto cariopse, de 7-8 mm de largo, muy comprimido dorsi-ventralmente y acanalado en U, de color castaño-violáceo. Florece en verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA

Gramínea

AMBIENTE NATURAL

Herbazales húmedos y praderas.

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Sin información

Forma: Sin información

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

Bromus racemosus

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Habita lugares variados, dispersada al Sur de Uruguay

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011