

Cakile maritima Scop.

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Magnoliopsida
 ORDEN: Capparidales
 FAMILIA: Cruciferae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Rábano marino / Español

SINÓNIMOS
Rapistrum maritimum (Scop.) Bergeret ex DC.

DESCRIPCIÓN

Hierba anual de tallos erectos o suberectos, de 10-50 cm de altura, glabra. Hojas carnosas o semicarnosas, glaucas, largas de 3-8 cm de segmentos obtusos. Flores blancas o liláceas de 2 cm de diámetro. Fruto silícula de 1-2 cm de largo, formada por dos artejos [segmentos], el inferior con dos salientes laterales, el superior de ápice alargado. Florece en el verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Herbácea

AMBIENTE NATURAL
 Costa arenosa, en la línea de costa

REPRODUCCIÓN
 Semillas

DISPERSIÓN
Ruta: Vegetación flotante • restos o desechos
Vector: Agua • Viento

INTRODUCCIÓN
Causa: Por transporte de materiales naturales
Forma: Accidental
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Cordón dunar, vegetación costera reas disturbadas, áreas urbanas, terrenos removidos, baldíos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información