

Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S. Johnson

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Magnoliopsida
 ORDEN: Solanales
 FAMILIA: Convolvulaceae



Foto Silvana Masciadri


NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Eucalipto limón / Español

SINÓNIMOS
Eucalyptus citriodora Hook.
Eucalyptus maculata var. *citriodora* (Hook.) F.M. Bailey

DESCRIPCIÓN

Árbol grande, corteza caduca en placas de color claro. Primeras hojas opuestas perfumadas con olor cítrico; las adultas de 10-20 cm de largo x 0,5-1,8 cm de ancho, alternas, falcadas, ápice agudo acuminado, base cuneada, perfumadas con olor cítrico. Flores dispuestas en inflorescencias compuestas terminales o axilares. Pedúnculos de 0,3-0,5 cm de largo, cilíndricos. Opérculo hemisférico, apiculado, menor que el hipanto. Frutos de 0,7-1,5 x 0,4-0,6 cm, ovoides a urceolados, cortamente pedicelados. Valvas 3-4 muy inclusas.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Arbórea

AMBIENTE NATURAL
 Zona costera y continental, clima tropical a subtropical, húmedo-subhúmedo. Suelos variados.

REPRODUCCIÓN
 Semillas

DISPERSIÓN
Ruta: Sin información
Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN
Causa: Para fines ornamentales
Forma: Voluntaria
Sitio: Montevideo
Fecha: 1850

USO ECONÓMICO
 Cultivado en cortavientos, montes de abrigo, forestaciones comerciales, ornamentales.

Corymbia citriodora

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información