

*Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844)

REINO:..... Animalia  
 PHYLUM:..... Chordata  
 CLASE:..... Teleostomi  
 ORDEN: ..... Cypriniformes  
 FAMILIA: ..... Cyprinidae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA  
 Carpa herbívora / Español  
 Grass carp / Inglés

SINÓNIMOS  
*Leuciscus idella* Valenciennes, 1844

DESCRIPCIÓN

Espinas dorsales: 3 - 3; Radios dorsales: 7 - 8; Espinas anales: 3; Radios anales: 7 – 11. No tiene barbillones mentonianos. Hocico muy corto, su largo es menor o igual que el diámetro del ojo. Largo pos-orbital más que la mitad del largo de la cabeza. Presenta 18 radios en la aleta caudal. Tolerante en un amplio rango de temperatura de 0-38°C, y salinidades de hasta 10 ppm y niveles de oxígeno menores a 0,5 ppm.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA  
 Pez

AMBIENTE NATURAL  
 Demersal potamodromo de agua dulce y rango de profundidad de 0-30 m. Habita lagos, estanques y embalses de grandes ríos, prefiriendo cuerpos de agua de poca corriente con vegetación.

DIETA / ALIMENTACIÓN  
 Herbívoro • Detritívoro • Insectívoro

REPRODUCCIÓN  
 Sexual

DISPERSIÓN  
**Ruta:** Acuicultura  
**Vector:** Agua

INTRODUCCIÓN  
 Introducida desde Brasil  
**Causa:** En asociación con acuicultura  
**Forma:** Voluntaria  
**Sitio:** Sin información  
**Fecha:** 1994

USO ECONÓMICO  
 Acuicultura

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN  
 Aguas continentales, Lagos, Ríos.  
 Evaluada en Fishbase como potencial plaga

IMPACTOS ECOLÓGICOS  
 Constatada como especie plaga

IMPACTOS (ECONÓMICOS, DE SALUD)  
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)  
 Sin información

PREVENCIÓN  
 Sin información