

Cynodon dactylon (L.) Pers.*

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Liliopsida
 ORDEN: Cyperales
 FAMILIA: Poaceae



Foto Silvana Masciadri

NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Pasto bermuda / Español
 Gramilla / Español
 Devilgrass / Inglés
 Bermuda grass / Inglés


SINÓNIMOS

Capriola dactylon (L.) Kuntze
Panicum dactylon L.

DESCRIPCIÓN

Hierba perenne de 10-30 cm, rizomatosa y estolonífera. Hojas con lígula formada por un anillo de pelos. Inflorescencia digitada, formada por 2-7 espigas patentes, en ocasiones violáceas. Espiguillas sentadas, con 1 flor, dispuestas en dos hileras a lo largo de las ramas.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA

Gramínea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Sexual • Vegetativa

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación • Agricultura

Vector: Suelo • Viento

INTRODUCCIÓN

Fue introducida por los ingleses para fijar las vías del ferrocarril. Actualmente se puede considerar cosmopolita

Causa: Fijación de suelo

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: 1900

USO ECONÓMICO

Su utiliza como tapiz herbáceo en jardinería, ya que sus características de planta rizomatosa, rústica y agresiva, permite colonizar todo tipo de suelos, incluso los más pobres

Cynodon dactylon *

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Agricultura, áreas disturbadas, pastizales, costa rocosa, costa arenosa, arbustales. Distribuido en todo tipo de suelos ya que es altamente tolerante a salinidades elevadas y aguas de baja calidad, además de su alta resistencia al pisoteo.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

* registradas como invasoras en al menos una localidad

ABRIL 2011