

Cyperus rotundus L.

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Liliopsida
 ORDEN: Cyperales
 FAMILIA: Cyperaceae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Pasto bolita / Español

SINÓNIMOS
Chlorocyperus rotundus (L.) Palla
Pycneus rotundus (L.) Hayek

DESCRIPCIÓN

Planta perenne, rizomatosa con tubérculos y estolones finos de 1 mm. Hojas de 5-8, con lámina de 2-4 mm de ancho, con margen escabroso en la parte superior. Espiguillas de 10-30 mm de largo con glumas rojizas. Fruto aquenio de 1,2 a 1,5 mm, elipsoide, trígono, apiculado, castaño-grisáceo, Florece en primavera, verano y otoño.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Herbácea

AMBIENTE NATURAL
 Suelos húmedos

REPRODUCCIÓN
 Semillas • Rizomas

DISPERSIÓN
Ruta: Autopropagación • Agricultura
Vector: Suelo • Viento

INTRODUCCIÓN
Causa: Por transporte de materiales naturales
Forma: Accidental
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Sin información

Cyperus rotundus

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Maleza que ha evolucionado con la agricultura. Invasora en cultivos de arroz, maíz y de regadío

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información