

Echium plantagineum L.

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Magnoliopsida
 ORDEN: Lamiales
 FAMILIA: Boraginaceae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Borraja cimarrona / Español
 Flor morada / Español

SINÓNIMOS
Echium violaceum L.

DESCRIPCIÓN

Hierba anual o bienal, que alcanza florecida 50-100cm. Hojas basales en rosetón aplanado, oblongo-elípticas hasta espatuladas, angostadas en el pecíolo, vellosas hasta híspidas, de 15 a 25 cm; las caulinares alargadas, de base semi-amplexicaule, íntegras, largas de 5-10 cm. Flores azul-violáceo hasta róseo y raramente blanco, dispuestas en cincinos sobre ramificaciones laterales del tallo. Cáliz 5 partido, de 8 mm de largo de sépalos híspidos. Fruto incluido en el cáliz, éste algo acrecido.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Herbácea

AMBIENTE NATURAL
 Campos y terrenos arenosos

REPRODUCCIÓN
 Semillas

DISPERSIÓN
Ruta: Autopropagación
Vector: Viento • Suelo

INTRODUCCIÓN
Causa: Por transporte de materiales naturales
Forma: Accidental
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Agricultura, áreas disturbadas, terrenos baldíos, bordes de caminos, maleza de cultivos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL QUÍMICO
Todo proceso de control se debe realizar con equipamiento de seguridad y en el caso de uso de productos químicos, siguiendo la orientación del fabricante y observando los cuidados para evitar impactos ambientales paralelos.
 Uso de herbicidas

CONTROL (FÍSICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información