

Mus musculus (Linnaeus, 1758) *

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Chordata
 CLASE:..... Mammalia
 ORDEN: Rodentia
 FAMILIA: Muridae



Foto Enrique M. González


NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Ratón / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Coloración dorsal gris, gris amarillento a gris castaño, hasta negro; ventral gris o blanquecino. Cola con filas de escamas circulares y escasos pelos esparcidos, del mismo largo que la longitud cabeza-cuerpo. Hábito nocturno, buen trepador aunque no es arborícola. Omnívoro, aunque asociado a depósitos de granos y alimentos de almacén. El período de gestación es de 20-22 días, con hasta 5 pariciones por año de 5 a 10 crías por cada una.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Mamífero

AMBIENTE NATURAL
 Praderas: campos abiertos, pasturas, campos cultivados.

DIETA / ALIMENTACIÓN
 Omnívoro

REPRODUCCIÓN
 Sexual

DISPERSIÓN
Ruta: Agricultura • Comercio de alimentos vivos • Comercio de semilleros
Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN
Causa: En asociación con comercio de alimentos
Forma: Accidental
Sitio: Rosario
Fecha: 1888

USO ECONÓMICO
 Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
 Agricultura, áreas urbanas. Asociado a las construcciones humanas y actividades agrícolas.

IMPACTOS ECOLÓGICOS
 Sin información

IMPACTOS DE SALUD
 Portadores de enfermedades virales y bacteriales

IMPACTOS ECONÓMICOS
 Pérdidas de cosechas

CONTROL FÍSICO
 Uso de trampas

CONTROL QUÍMICO
Todo proceso de control se debe realizar con equipamiento de seguridad y en el caso de uso de productos químicos, siguiendo la orientación del fabricante y observando los cuidados para evitar impactos ambientales paralelos.

Uso de venenos

PREVENCIÓN
 Sin información

* registradas como invasoras en al menos una localidad