

# Nandayus nenday (Vieillot, 1823)

REINO:..... Animalia  
 PHYLUM:..... Chordata  
 CLASE:..... Aves  
 ORDEN: ..... Psittaciformes  
 FAMILIA: ..... Psittacidae



## NOMBRE COMÚN / IDIOMA


Loro cabeza negra / Español  
 Black-hooded parakeet / Inglés

## SINÓNIMOS

## DESCRIPCIÓN

Cotorra de 30-34 cm de largo y hasta 140 gr. de peso. Plumaje color verde, con una mancha azul-negra rodeando la parte superior de la cabeza, que llega a la base del pico y borde de los ojos. Por debajo de éstos presenta un verde más pálido cruzada por una franja negra. En la zona de garganta presenta un collar de color azulado. Las alas son de color negro-azulado. La parte inferior de la cola es verde oscuro y el pico negruzco. Los juveniles presentan una cola más corta que los adultos. No presentan dimorfismo sexual.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



## ORIGEN GEOGRÁFICO

## FORMA BIOLÓGICA

Ave

## AMBIENTE NATURAL

Habitan sabanas, zonas boscosas y palmerales, siendo el típico ave del Pantanal. Generalmente se encuentran en las proximidades de cursos de agua.

## DIETA / ALIMENTACIÓN

Granívoro • Frugívoro

## REPRODUCCIÓN

Sexual

## DISPERSIÓN

**Ruta:** Sin información

**Vector:** Sin información

## INTRODUCCIÓN

**Causa:** En asociación con comercio de mascotas

**Forma:** Voluntaria

**Sitio:** Sin información

**Fecha:** Sin información

## USO ECONÓMICO

Sin información

# Nandayus nenday

## AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Bosques. Registrado al Suroeste de Uruguay. Poco común.

## IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

## CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

## PREVENCIÓN

Sin información