

Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Chordata
 CLASE:..... Mammalia
 ORDEN: Lagomorpha
 FAMILIA: Leporidae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Conejo / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Coloración dorsal gris amarillento, ventral blanco. Cola con dorso negro y ventralmente blanca de 6 cm de largo. La nuca es rojiza. Presentan un círculo claro alrededor de los ojos. Orejas de menos de 9 cm de largo. Miembros anteriores y posteriores cortos. Hábito gregario, crepuscular y nocturno. Hervíboros, hasta granívoros y frugívoros. Pueden tener camadas cada 40 días, con 2 a 12 crías por cada una. Alcanzan la madurez sexual entre los 5 y 8 meses de edad.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Mamífero

AMBIENTE NATURAL
 Áreas modificadas por el hombre, granjas y ciudades.

DIETA / ALIMENTACIÓN
 Herbívoro • Granívoro • Frugívoro

REPRODUCCIÓN
 Sexual

DISPERSIÓN
Ruta: Autopropagación
Vector: Humano

INTRODUCCIÓN
 Fue introducida en las Islas costeras del Río de la Plata y Océano Atlántico para alimentación de marineros.
Causa: Para fines alimenticios
Forma: Voluntaria
Sitio: Islas del Océano Atlántico y Río de la Plata
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Cría para alimentación

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
 Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información

Oryctolagus cuniculus