

Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852)

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Mollusca
 CLASE:..... Gastropoda
 ORDEN: Stylommatophora
 FAMILIA: Punctidae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA


SINÓNIMOS

Punctum conspectum (Bland, 1865).
Paralaoma caputspinulae (Reeve, 1852)

DESCRIPCIÓN

Caracol de entre 1 y 2 mm de largo total, el ombligo es un tercio de diámetro de la concha.
 Pie blancuzco. Cabeza y tentáculos oscuros hasta negros.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Molusco

AMBIENTE NATURAL
 Hojarasca en descomposición, bajo
 árboles caducos

DIETA / ALIMENTACIÓN
 Sin información

REPRODUCCIÓN
 Sexual

DISPERSIÓN
Ruta: Sin información
Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN
Causa: Sin información
Forma: Accidental
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE
 SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información

Paralaoma servilis