

Phoneutria nigriventer (Keyserling, 1891)

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Arthropoda
 CLASE:..... Arachnida
 ORDEN: Araneae
 FAMILIA: Ctenidae



Foto Miguel Simó

NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Araña del banano / Español

SINÓNIMOS
Phoneutria keyserlingi (Pickard-Cambridge, 1897)

DESCRIPCIÓN

Arácnido bastante grande, las hembras de 3-5 cm de largo corporal con un legspan de 13-15 cm. Los machos son más pequeños, de 3-4 cm de largo corporal y un legspan de 15 cm. El color varía dependiendo de la localidad, pero comunmente es de color marrón con pequeños puntos más claros, con una línea más oscura localizada en pares en el abdomen. El lado ventral es usualmente más oscuro con una mancha marrón oscuro o negra en el abdomen (de ahí su nombre nigriventer).

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Arácnido

AMBIENTE NATURAL
 Bosques tropicales y subtropicales

DIETA / ALIMENTACIÓN
 Carnívoro

REPRODUCCIÓN
 Sexual

DISPERSIÓN
 Contenedores (containers)

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN
 Ingresada en cargamentos de banana desde Brasil.

Causa: En asociación con comercio de comida viva

Forma: Accidental

Sitio: Montevideo

Fecha: 1971

USO ECONÓMICO
 Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS)
 Sin información

IMPACTOS DE SALUD
 Han sucedido picaduras en las personas que trabajan manejando este recurso en el Mercado Modelo

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información