

Rattus rattus Linneaus, 1758 *

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Chordata
 CLASE:..... Mammalia
 ORDEN: Rodentia
 FAMILIA: Muridae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Rata / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Coloración dorsal negro-grisáceo a castaño, y ventral gris o blanquecino. Cola más larga que la longitud del cuerpo entero de 16-24 cm, cubierta de pelos esparcidos y escamas. Pollex rudimentario. Hábito diurno y nocturno, territoriales y sociales. Se reproducen durante todo el año. Las camadas pueden ser de 3 a 22 crías. La gestación dura entre 22 y 29 días e hembras no lactantes y lactantes respectivamente. La madurez sexual se alcanza a los 80 días de edad.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Mamífero

AMBIENTE NATURAL
 Arbustales, cañaverales, bosques densos, y adaptada en áreas pobladas desde siglos AC.

DIETA / ALIMENTACIÓN
 Omnívoro

REPRODUCCIÓN
 Sexual

DISPERSIÓN
Ruta: Autopropagación
Vector: Humano • Basura

INTRODUCCIÓN
Causa: En asociación con comercio internacional
Forma: Accidental
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Caza
 Venta de carne y subproductos elaborados

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
 Áreas urbanas

IMPACTOS ECOLÓGICOS
 Sin información

IMPACTOS ECONÓMICOS
 Daños sobre cultivos

IMPACTOS DE SALUD
 Portadores y dispersores de varias enfermedades

CONTROL BIOLÓGICO
 Predadores naturales domésticos como gato y perro

CONTROL FÍSICO
 Trampas

CONTROL QUÍMICO
Todo proceso de control se debe realizar con equipamiento de seguridad y en el caso de uso de productos químicos, siguiendo la orientación del fabricante y observando los cuidados para evitar impactos ambientales paralelos.
 Uso de venenos

PREVENCIÓN
 Sin información

* registradas como invasoras en al menos una localidad