

# Rumex crispus L.

REINO:..... Plantae  
 PHYLUM:..... Magnoliophyta  
 CLASE:..... Magnoliopsida  
 ORDEN: ..... Polygonales  
 FAMILIA: ..... Polygonaceae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA  
 Lengua de vaca / Español

SINÓNIMOS  
*Lapathum crispum* (L.) Scop.

## DESCRIPCIÓN

Hierba perenne, glabra, de tallo simple o ramificado, erecto, de hasta 100 cm de altura, de raíces gruesas. Hojas basales grandes, de lámina olongo-lanceolada con márgenes ondulados o crespos, 15-35 cm de largo. Pecíolos gruesos poco más cortos que la lámina. Hojas superiores menores y crespas. Flores pediceladas, reunidas en glomérulos, dispuestos en ramas espiciformes, agrupadas en gran panoja terminal. Fruto trígono de unos 4mm de largo, con valvas acrescidas, membranosas, hasta circulares, de bordes íntegros, base cordada y ápice obtuso. Las panojas fructificadas cuando maduran los frutos se tornan de color castaño. Florece en Primavera, aunque hay registros de plantas florecidas en Otoño e Invierno.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA  
 Herbácea

AMBIENTE NATURAL  
 Campos húmedos, terrenos removidos, bordes de caminos

REPRODUCCIÓN  
 Semillas

DISPERSIÓN  
**Ruta:** Autopropagación  
**Vector:** Agua • Suelo

INTRODUCCIÓN  
**Causa:** Por transporte de materiales naturales  
**Forma:** Accidental  
**Sitio:** Sin información  
**Fecha:** Sin información

USO ECONÓMICO  
 Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES  
 DE INVASIÓN  
 Agricultura, humedales, terrenos húmedos, pastizales, arbustales y áreas disturbadas en general.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)  
 Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)  
 Sin información

PREVENCIÓN  
 En *Rumex* spp. se puede aprovechar en el momento de la floración cortar el tallo floral, evitando la producción de frutos, ya que tienen una gran producción de semillas.