

Spartium junceum L.*

REINO:..... Plantae
PHYLUM:..... Magnoliophyta
CLASE:..... Magnoliopsida
ORDEN: Fabales
FAMILIA: Leguminosae



Foto Liliana Delfino


NOMBRE COMÚN / IDIOMA
Retama amarilla / Español
Retama española / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Arbusto inerme que puede alcanzar los 2-3 m de altura. Hojas lineales, íntegras, sedoso-pubescentes con mayor intensidad en la cara inferior. Floración muy abundante, vistosa, que tiñe de amarillo el paisaje campestre. Flores muy perfumadas, amarillas, con estandarte erecto y circular, alas grandes y abiertas. Fruto legumbre aplanada que contiene alrededor de 10 semillas. Florece en primavera.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
Herbácea

AMBIENTE NATURAL
Caminos y campos. Preferencia por suelos calcáreos.

REPRODUCCIÓN
Semillas • Vegetativa

DISPERSIÓN
Ruta: Parquización • Autopropagación
Vector: Humano • Agua

INTRODUCCIÓN
Causa: Para fines ornamentales
Forma: Voluntaria
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
Planta subxerófila, invadiendo campos y áreas disturbadas, pastizales, arbustales. Periurbano.

Spartium junceum *

IMPACTOS ECOLÓGICOS
Cambios en la estructura de la comunidades nativas

IMPACTOS (ECONÓMICOS, DE SALUD)
Sin información

CONTROL FÍSICO
Eliminar la producción de frutos y semillas; extracción mecánica antes de su floración.

CONTROL BIOLÓGICO
Sin información

CONTROL QUÍMICO
Todo proceso de control se debe realizar con equipamiento de seguridad y en el caso de uso de productos químicos, siguiendo la orientación del fabricante y observando los cuidados para evitar impactos ambientales paralelos.
Uso de herbicidas

PREVENCIÓN
No utilizarla como ornamental

* registradas como invasoras en al menos una localidad