

Styela plicata (Lesueur, 1823) *

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Chordata
 CLASE:..... Ascidiacea
 ORDEN: Stolidobranchia
 FAMILIA: Styelidae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Pleated sea squirt / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Especie de gran tamaño, de apariencia variable. Forma oval, de color grisáceo a blanuzco o naranja, con rayas purpúreas en los sifones. Túnica coriácea, lisa o con arrugas. Sifones con 4 lóbulos, amarronados internamente. Solitarios, aunque a menudo e grandes grupos.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



0 100 200 km

ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Ascidia

AMBIENTE NATURAL
 Aguas marinas costeras

DIETA / ALIMENTACIÓN
 Sin información

REPRODUCCIÓN
 Sexual

DISPERSIÓN
 Desarrollo directo (sin larvas planctónicas)
Ruta: Por transporte marítimo o fluvial
Vector: Agua • Barco - Agua de lastre

INTRODUCCIÓN
 Styela plicata fue encontrada en 1992 - 1993 por G. Fabiano, en estructuras portuarias, cascos de barcos y cañerías de toma de agua.
Causa: Por transporte de materiales naturales
Forma: Accidental
Sitio: Puerto de La Paloma
Fecha: 1992

USO ECONÓMICO
 Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
 Aguas marinas costeras

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información

* registradas como invasoras en al menos una localidad