

Tragopogon porrifolius L.

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Magnoliopsida
 ORDEN: Asterales
 FAMILIA: Asteraceae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Salsifí / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Hierba bienal, erecta, glabra, de 20-80 cm al florecer, con raíz gruesa. Hojas lineales a lineal-lanceoladas, íntegras, de 10-40 cm de largo de base algo abrazadora. Capítulos terminales, mediano-grandes, sobre un pedúnculo engrosado en la parte superior, hueco. Involucro de 2,5-4 cm de altura. Brácteas lanceoladas, largamente atenuadas en el ápice. Flores lilas, violáceas o rojo-purpúreas. Fruto aquenio de 10-14 mm, con 10 costillas y espínulas cortas, con rostro más largo que el aquenio. Pappus plumoso de 10-15 mm de largo. Florece en primavera.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Herbácea

AMBIENTE NATURAL
 Cunetas, orillas de campos, pasturas secas y subnitrófilos

REPRODUCCIÓN
 Semillas • Rizomas

DISPERSIÓN
Ruta: Autopropagación • Agricultura
Vector: Viento • Suelo

INTRODUCCIÓN
Causa: Por transporte de materiales naturales
Forma: Sin información
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Agricultura. Cultivada por su raíz comestible

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
 Áreas disturbadas, áreas urbanas. Habita en orillas de caminos, terrenos removidos, parque y jardines.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información